



## **Leczenie miodem wrzodu na kończynie dolnej zarażonego gronkowcem złocistym, wywołanym hydroksykarbamidem**

### **WPROWADZENIE**

W związku z ciągle rosnącą liczbą odpornych na antybiotyki patogenów, w szczególności odpornego na metycylinę *Staphylococcus aureus* (MRSA) we wrzodach kończyn dolnych, niezbędny jest środek powodujący redukcję zanieczyszczeń bakteryjnych w takich wrzodach. Środek ten musi być inny niż antybiotyki systemowe lub przystosowany do stosowania zewnętrznego.

### **METODY**

Przedstawiamy przypadek pacjenta z immunosupresją, u którego rozwinął się wrzód kończyny dolnej wywołany hydroksykarbamidem z subkliniczną infekcją MRSA. Wrzód był leczony poprzez zewnętrzną aplikację Miodu Manuka, bez wstrzymania hydroksykarbamidu i cyklosporyny.

### **REZULTATY**

MRSA zostało zlikwidowane z wrzodu i osiągnięto natychmiastowe wyleczenie.

### **WNIOSEK**

Miód posiada właściwości antybakteryjne i może sprzyjać efektywnemu leczeniu ran. A zatem tradycyjna terapia okazuje się mieć niezwykle potężny potencjał w rozwiązywaniu nowych problemów.

Natarajan S, Williamson D, Grey J, Harding KG, Cooper RAMA -  
subramanian\_natarajan@hotmail.comRA - Natarajan S,

*Journal of Dermatological Treatment*. 12(1):33-36, 2001 Mar. AS - J. Dermatol. Treat 2001 marzec  
12(1):33-36PU - MARTIN DUNITZ LTD, LIVERY HOUSE, 7-9 PRATT